



# **DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI COLORECTAL (SCREENING)**

**DR. RAMONA MARIA COCA**

**DUPĂ RECOMANDĂRILE EUROPENE**

**≥50  
ani**

## **SCREENING-UL CANCERULUI COLORECTAL**

- **Motivație:**
  - Pot exista polipi la nivelul colonului și rectului care se pot maligniza (transforma în cancer)
  - Screening-ul poate identifica acești polipi înainte de a deveni canceroși, adică în stadiul de leziuni premaligne
  - Oferă o supraviețuire îndelungată pentru stadiile incipiente ale bolii
- **Obiectiv :**
  - identificarea cazurilor sporadice de cancer CR care apar la > 50 ani
- **Comitetul Consultativ al Uniunii Europene sugerează:**
  - testul hemoragiilor oculte (la noi, testul Adler din scaun)
  - colonoscopia în cazurile pozitive la primul test
- **Screeningul**
  - trebuie să fie propus persoanelor cu vârsta între 50–74 ani (**≥ 50 ani**)
  - intervalul de screening trebuie să fie de 1- 2 ani
  - **excepție (<50 ani):**
    - ✓ rudă de gradul I cu CCR sau polipi CR,
    - ✓ APP de boală inflamatorie a colonului: boala Crohn sau colită ulcerative
    - ✓ boli genetice: FAP, sdr. Lynch

# SCREENINGUL CANCERULUI DE COLON ȘI RECT

**Get screened!**



**It's the single best thing you can do to prevent colon cancer.**

## 1. Test de sângerare ocultă:

-există teste speciale care se pot folosi foarte simplu și acasă și care pot determina printr-o reacție de culoare prezența sângerărilor în cantități mici prezente în scaun (nu se văd cu ochiul liber). Aceste teste nu sunt încă disponibile în farmaciile noastre.

-un test cu aceeași valoare se poate efectua și în laboratorul nostru: **testul ADLER** (din scaun)

1. **Colonoscopia** (optim pentru colonoscopie 55 ani): se efectuează cu anestezie în secția de gastroenterologie a spitalului nostru